

Gebruikershandleiding voor zorgverleners in de geboortezorg

Versie 1.0.1 – Maart 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Inleiding	2
Zorgverlening	3
Vrouw	9
Zwangerschap	10
Bevalling	11
Uitkomst per kind	12

Inleiding

Om te komen tot een eenduidige uitwisseling of delen van gegevens tussen de verschillende softwaresystemen van de zorgverleners in de Nederlandse Geboortezorg zijn drie onderdelen van belang:

- 1) De softwaresystemen moeten op een gebruiksvriendelijke manier gegevens kunnen uitwisselen of delen onderling en met de cliënt. Hiervoor is het VIPP¹-programma Babyconnect gestart. <https://babyconnect.org/>
- 2) Alle softwaresystemen moeten dezelfde taal spreken. Hiervoor zorgt – na bekrachtiging door de Autorisatieraad Geboortezorg – de Expertgroep Eenheid van Taal van de Stichting Perined met technische ondersteuning van Nictiz. Zij hebben de data-elementen binnen de verloskunde, de kindergeneeskunde en de kraamzorg opnieuw bekeken, aangepast en van een Snomed code voorzien. Hierdoor kan het niet meer voorkomen dat de ene computer niet weet wat de andere bedoelt. Omdat alle betrokken organisaties (waaronder KNOV - NVOG - NVK - BO geboortezorg) het belang hiervan in zagen is een Informatiestandaard ontwikkeld waardoor alle systemen hier mee gaan werken.
- 3) Het is van belang dat het patiëntendossier onafhankelijk van zorgverlener, zorginstelling of softwaresysteem op dezelfde wijze worden ingevuld. Hiervoor is deze handleiding bedoeld. Hierin kunt u aanvullende informatie vinden hoe iets in te vullen. Als iedereen zo veel mogelijk op dezelfde manier gaat invullen zal dit de zorg en de betrouwbaarheid van de cijfers ten goede komen.

De handleiding is een levend document waar constant aan gewerkt wordt en die periodiek wordt aangepast. Er is besloten om vast het eerste deel (versie 1.0) te publiceren. De gebruikershandleiding is geschreven op geleide van de Nictiz dataset perinatologie 2.3. Dit is niet noodzakelijkerwijs ook de volgorde waarin uw softwareleverancier dit in uw systeem heeft ingebouwd. Door echter binnen het document de knoppen Ctrl + f tegelijk in te drukken kunt u zoeken naar de woorden die u nodig heeft. Het belangrijkste voor de zorgverlener is het invul advies, daar staat wat bedoeld wordt.

Versiebeheer

Voor u als zorgverlener is het van belang dat u weet met welke versie van het handboek u aan het werk bent. Daarom zullen we aangeven wanneer de verschillende versies gepubliceerd zijn zodat u kunt zien of u de meest recente versie heeft.

Versie	Dataset	Publicatiedatum
Gebruikershandleiding 1.0	Perinatologie 2.3	September 2020
Gebruikershandleiding 1.0.1	Perinatologie 2.3	Maart 2021

Omdat deze gebruikershandleiding een levend document is stelt de expertgroep Eenheid van Taal voorstellen tot aanpassing of verzoeken om verheldering zeer op prijs. U kunt uw mails daarover richten aan Perined: info@perined.nl

¹ VIPP = Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

Zorgverlening

Naam	Nummer	Invuladvies
Zorgverlening	Peri23-dataelement-4	
Datum start zorgverantwoordelijkheid	peri23-20290	Vul hier de datum in van het eerste contact met de patiënt. We spreken van contact als de patiënte in de wachtkamer of wachtruimte op haar afspraak met de arts, verpleegkundige, assistente of andere hulpverlener wacht, of als tevoren (telefonisch) over de specifieke patiënt medisch advies gegeven is.
Datum einde zorgverantwoordelijkheid	peri23- 20340	Vul hier de <u>exacte</u> datum in van dag waarop de zorg voor de patiënt is overgenomen door een andere zorginstelling, of de zorg in zijn geheel beëindigd is. (Dus <u>niet</u> de datum van verwijzing, behalve als de datum van verwijzing en overname dezelfde zijn.) Als je, als ziekenhuis b.v., niet het kraambed verzorgt, kies dan niet voor einde zorg 6 weken postpartum , maar de datum van ontslag/overdracht.
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?	peri23-20355	Kies uit de waardelijst de juiste perinatale periode waarin de zorginstelling eindverantwoordelijk was. Hier wordt bedoeld de perinatale periode waarin er sprake was van een behandelovereenkomst. Let op u kunt meerdere perioden aanvinken.
Verwijsdetails	peri23-82012	
Datum verwijzing	peri23-82013	Vul hier de exacte datum in van de dag waarop u uw zorgverzoek voor de patiënt heeft verstuurd. Dus de datum van verwijzing voor consult of overname
Verwijzing (afkomstig) van	Peri23-82550	
Zorginstelling	peri23-82551	
Zorgaanbieder identificatienummer	peri23-82552	U hoeft hier niets in te vullen. Het identificatienummer van uw organisatie wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Verwijzing naar	peri23-82577	
Zorginstelling	Peri23-82578	

Zorgaanbieder Identificatienummer	peri23-82579	Vul eerst de naam van de zorginstelling in naar wie u verwijst en uw systeem zal dit nummer automatisch invullen.
Specialisme	peri23-82580	Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de zorgverlener waarnaar u verwijst.
Type verwijzing	peri23-82581	Gaat het om een consult of een overname? De verwijzende partij, u dus, bepaalt bij een verwijzing na overleg met de ontvangende partij, of het een consult of overname betreft. Indien consult resulteert in een nieuwe verwijzing dan dient u een nieuwe verwijzing aan te maken. Let op: denk aan het invullen van de datum einde zorg- verantwoordelijkheid
Reden van verwijzing	peri23-82014	
Verwijzing van 1e naar 2e lijn	peri23-82450	
Algemene anamnese	Peri23-82454	
Auto-immuun aandoening	Peri23-82456	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op kijk ook in andere groepen. Crohn bijvoorbeeld staat onder MDL aandoening
Cardiovasculaire aandoening	Peri23-82458	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Urogenitale aandoening	Peri23-82460	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Oncologische aandoening	Peri23-82462	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Schildklier aandoening	Peri23-82464	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Diabetes mellitus?	Peri23-82465	Vul hier Ja in als er sprake is van diabetes mellitus (type I of type II) Kies anders voor nee Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
Neurologische aandoening	Peri23-82467	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Infectieziekte	peri23-82469	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
MDL aandoening	peri23-82471	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Anemie	peri23-82473	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.

Longaandoening	peri23-82475	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Gynaecologische aandoening	peri23-82477	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Vermeld worden, pre existente gynaecologische aandoeningen, met mogelijke consequenties voor de zwangerschap
Orthopedische afwijking	peri23-82479	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Bloedtransfusie?	peri23-82481	Vul hier Ja in als er sprake is van een bloedtransfusie. Kies anders voor Nee. Denk ook aan de bloedtransfusie gegeven tgv een fluxus post partum. Ook dan kiest u voor "Ja"
Transfusiereactie?	peri23-82482	Vul hier Ja in, indien er sprake is van een transfusiereactie. kies anders voor Nee.
Type operatie	peri23-82484	Kies uit de waardelijst de juiste operatie die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Type stollingsprobleem	peri23-82486	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Psychiatrie	peri23-82488	Vul hier ja in indien er sprake is van een psychiatrische aandoening. Kies anders voor Nee. Kies alléén Ja bij de <u>gediagnosticeerde</u> psychiatrische aandoeningen niet bij psychosociale problemen
Overige aandoening?	peri23-82490	Vul hier Ja in indien er sprake is van een overige aandoening. Kies anders voor Nee
Obstetrische anamnese	peri23-82492	Met een verwijzing worden zowel verwijzingen als consulten bedoeld.
Gynaecologische aandoening	Peri23-82582	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Bloedverlies	peri23-82493	Vul hier Ja in als ergens in een zwangerschap bloedverlies heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee
Partiële mola?	peri23-82494	Vul hier Ja in indien in een zwangerschap sprake was van een partiële mola Kies anders voor Nee.
Cervixinsufficiëntie?	peri23-82495	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee. Kijk voor de definitie van Cervixinsufficiëntie naar de omschrijving hierover binnen uw eigen VSV
Infectie	peri23-82496	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Hyperemesis Gravidarum?	peri23-82497	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van hyperemesis gravidarum, kies anders voor Nee. Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.

Hypertensieve aandoening	peri23-82498	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Zwangerschapscholestase?	peri23-82499	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van zwangerschapscholestase. Kies anders voor Nee. Een zwangerschapscholestase is een aandoening gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met een verhoogde concentratie van random serum galzuren. (NVOG richtlijn 2018)
Diabetes Gravidarum met insuline ?	peri23-82500	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van diabetes gravidarum met insuline. Kies anders voor Nee.
Afwijkende groei foetus	peri23-82501	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Dreigende partus immaturus?	peri23-82502	Vul hier ja in indien in een zwangerschap een opname is geweest wegens een dreigende partus immaturus (16w0d tot en met 27w+6d. Kies anders voor Nee
Dreigende partus prematurus?	peri23-82503	Vul hier ja in indien in een dreigende partus prematurus (27w0d tot en met 36w+6d) Kies anders voor Nee
Abruptio placentae?	peri23-82504	Vul hier Ja in indien in een zwangerschap sprake was van een Abruptio Placentae. Kies anders voor Nee. Een abruptio placentae is een voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating van de placenta.
Fluxus postpartum?	peri23-82505	Vul hier ja in indien in een zwangerschap sprake was van een Fluxus postpartum. Kies anders voor Nee. Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van het kind tot 2 uur na geboorte van de placenta meer dan 1000 ml bloedverlies is. (Later dan twee uur postpartum valt n.l. onder het kraambed)
Zwangerschap	peri23-82506	
Gynaecologische aandoening	Peri23-82509	Kies uit de waardelijst de juiste gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap die van toepassing is.
Bloedverlies?	peri23-82510	Vul hier Ja in als ergens in de huidige zwangerschap bloedverlies heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee
Partiële mola?	Peri23-82511	Vul hier Ja in indien er sprake van een partiële mola met intacte zwangerschap. Kies anders voor Nee. We spreken van een partiële mola als er sprake is van een mola samen met een intacte zwangerschap Let op een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
Cervixinsufficiëntie?	peri23-82512	Vul hier Ja in indien er sprake is van een cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee. Kijk voor de definitie van Cervixinsufficiëntie naar de omschrijving hierover binnen uw eigen VSV
Infectie	peri23-82513	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.

Hyperemesis Gravidarum?	peri23-82514	Vul hier Ja in, indien er sprake is van hyperemesis gravidarum. Kies anders voor Nee. Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.
Hypertensieve aandoening	peri23-82515	Kies uit de waardelijst de juiste Hypertensieve aandoening.
Zwangerschaps-cholestase?	peri23-82516	Vul hier Ja in, indien er sprake is van zwangerschapscholestase Kies anders voor Nee. Een zwangerschapscholestase is een aandoening gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met een verhoogde concentratie van random serum galzuren. (NVOG richtlijn 2018)
Diabetes Gravidarum met insuline ?	peri23-82517	Vul hier Ja in indien er sprake is van diabetes gravidarum met insuline. Kies anders voor Nee.
Afwijkende groei foetus	peri23-82518	Kies uit de waardelijst de juiste afwijkende groei van de foetus.
Dreigende partus immaturus?	peri23-82519	Vul hier Ja in indien er sprake is van een dreigende partus immaturus. Kies anders voor Nee. Een dreigende partus immaturus is gedefinieerd als er een partus dreigt tussen 16w0d tot en met 27w6d.
Dreigende partus prematurus?	peri23-82520	Vul hier Ja in indien er sprake is van een dreigende partus prematurus. Kies anders voor Nee. Een dreigende partus prematurus is gedefinieerd als er een partus dreigt tussen 24w0d tot en met 36w6d.
Abruptio placentae?	peri23-82521	Vul hier Ja in indien er sprake is van een Abruptio placentae. Kies anders voor Nee. Een abruptio placentae is een voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating van de placenta.
Navelstrengprolaps?	Peri23-82522	Vul hier Ja in indien er sprake is van een navelstrengprolaps. (uitgezakte navelstreng) Kies anders voor Nee.
Liggingsafwijking	peri23-82523	Kies uit de waardelijst de juiste liggingsafwijking in de huidige zwangerschap: Vanaf 36+0 dagen weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.
Intra-uterine vruchtdood	peri23-82524	
Vermoeden intra-uterine vruchtdood?	peri2382525	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.
Einde zwangerschap	peri23-82453	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de zwangerschap geëindigd is. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,Apla, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
Bevalling	peri23-82527	
PPROM?	peri23-82530	Vul hier Ja in indien er sprake is van PPROM. Kies anders voor Nee. PPROM = Spontaan breken van vliezen zonder weeën tot en met een zwangerschapsduur van 36w6d.
PROM?	peri23-82531	Vul hier Ja in indien er sprake is van PROM. Kies anders voor Nee.

		PROM = Spontaan breken van vliezen zonder weeën bij 37w0d of later.
Koorts?	peri23-82532	Vul hier Ja in indien er sprake is van koorts. Kies anders voor Nee.: We spreken van koorts bij een temperatuur > 38 graden Celsius.
Niet vorderende ontsluiting?	peri23-82533	Vul hier Ja in indien er sprake is van niet vorderende ontsluiting. Kies anders voor Nee. We gebruiken voor het vaststellen van niet vorderende ontsluiting de vigerende KNOV richtlijn.
Niet vorderende uitdrijving?	peri23-82534	Vul hier Ja in indien er sprake is van niet vorderende uitdrijving. Kies anders voor Nee. Voor het vaststellen van een niet vorderende uitdrijving wordt verwezen naar de vigerende NVOG richtlijn vaginale kunstverlossing.
Verdenking foetale nood?	peri23-82535	Vul hier Ja in indien er sprake is van een verdenking van foetale nood. Kies anders voor Nee. Er is verdenking foetale nood bij onder andere: Meconiumhoudend vruchtwater en/of cortonen pathologie
Intra-uterine vruchtdood	peri23-82536	
Vermoeden intra-uterine vruchtdood?	peri23-82537	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.
Vastzittende placenta?	peri23-82541	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vastzittende placenta. Kies anders voor Nee. Een placenta zit vast wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet geboren is.
Conditie perineum postpartum.	peri23-82543	Vul hier Ja in als de schade aan het perineum (postpartum) de reden is om de patiënt naar de 2 ^e lijn te verwijzen. Kies anders voor Nee
Fluxus postpartum?	peri23-82542	Vul hier Ja in als er sprake is van een fluxus postpartum. Kies anders voor Nee. Er is sprake van een fluxus postpartum wanneer er binnen twee uur na de geboorte van de placenta meer dan 1000 ml bloedverlies is.
Postnatale fase	peri23-82544	
Pathologie vrouw	peri23-82545	Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom u de patiënt postpartum naar de 2 ^e lijn verwezen heeft.
Overig	peri23-82442	Kies "Overig" als de reden om patiënt te verwijzen niet in de waardelijsten voorkomt en vul dit dan als vrije tekst in.
Perinatale periode	peri23-20367	Kies uit de waardelijst de juiste perinatale periode waarin patiënte werd verwezen.

Vrouw

Vrouw	peri23-dataelement-2	
Burgerservicenummer	peri23-10030	Vul hier het Burgerservicenummer van uw patiënt in.
Lokale persoonsidentificatie	peri23-10031	Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk in. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiënt/kaart nummer voor de 1e lijn of het patiënt/ziekenhuis nummer voor de 2e lijn.
Geboortedatum	peri23-10040	Vul hier de geboortedatum van uw patiënt in. Indien de dag en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u dit in als 01-01-xxxx. Wanneer het geboortjaar ook onbekend is, is schatten van het geboortjaar toegestaan.
Adres	peri23-10300	
Postcode	peri23-10304	Vul hier de postcode van het adres van uw patiënt in. Liever geen postcode van een postbusnummer!
Etniciteit	peri23-10400	Kies uit de waardelijst de juiste etniciteit van uw patiënt, conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld: https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
Lengte gemeten	peri23-20212	Vul hier in centimeters, de lengte van uw patiënt in.

Zwangerschap

Zwangerschap	peri23-dataelement-3	
Graviditeit	peri23-20010	Vul hier het aantal zwangerschappen Miskramen, EUG's, APLA's, TOP's etc. in, inclusief de huidige zwangerschap
Pariteit (vóór deze zwangerschap)	peri23-20150	Vul hier het aantal Partus in na 16+0 weken graviditeit in, levend- of dood geboren, in leven of niet meer in leven. Inclusief TOP
Definitieve à terme datum	peri23-82160	Vul hier de definitieve à terme datum in zodra die is vastgesteld. Bij voorkeur d.m.v. het protocol datering zwangerschap NVOG
Voornemens	peri23-80671	
Voorgenomen plaats baring tijdens de zwangerschap	peri23-20261	Kies uit de waardelijst de plaats waar de patiënt zelf wenst te bevallen. Het gaat hier uitdrukkelijk om de <u>wens van de vrouw</u> voor de bevalling. Soms wordt haar wens beperkt door de risicostatus.
Prenatale controle	peri23-80732	
Rookgedrag	peri23-80810	Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe veel, de patiënt per dag rookt.
Alcoholgebruik	peri23-80747	Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe veel, de patiënt per dag drinkt.
Drugsgebruik?	peri23-82102	Vul hier ja in als de patiënt enige vorm van drugs gebruikt. Vul ook Ja in als dit binnen een jaar voor de conceptie is gebruik. Kies anders voor Nee.
Wijze einde zwangerschap	peri23-80625	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de zwangerschap geëindigd is. In geval van TOP (Termination of Pregnancy) kiest u voor Partus. TOP zelf wordt elders geregistreerd..U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,Apla, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.

Bevalling

Bevalling	peri23-dataelement-6	
Partusnummer	peri23-20500	Vul hier het door u gekozen partus nummer in.
Aantal geboren kinderen	peri23-20505	Vul hier het aantal kinderen in dat tijdens deze partus geboren worden.
Interventies begin baring	peri23-20555	
Interventie begin baring	peri23-20560	Kies uit de waardelijst de juiste interventie om de baring te laten starten. LET OP: Een primaire sectio is een geplande sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en zelfs als de uitdrijving is begonnen.
Wijze waarop de baring begon	peri23-20550	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de baring naar uw mening begon.
Hoeveelheid bloedverlies	peri23-20640	Noteer hier de (liefst gemeten) hoeveelheid bloedverlies. Het bloedverlies wordt uitgedrukt in milliliters.. Let op: Het bloedverlies tijdens de baring wordt hier meegerekend.
Conditie perineum postpartum.	peri23-80673	Kies uit de waardelijst de juiste vorm van schade aan het perineum postpartum.

Uitkomst per kind

Uitkomst (per kind)	peri23-dataelement-7	
Baring	peri23-40002	
Werkelijke plaats baring	peri23-40003	Kies uit de waardelijst de juiste plaats waar de baring heeft plaatsgevonden
Ziekenhuis baring	peri23-82114	
Ziekenhuisnummer (LVR id)	peri23-40005	Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden vermeld u hier het LVR nummer van het ziekenhuis. N.B. De meeste systemen zullen dit automatisch voor u invullen
Demografische gegevens	peri23-40006	
Identificaties Kind	peri23-40007	
BSN Kind	peri23-40010	Vul hier het BSN nummer van het kind in. Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt toegekend wanneer iemand ingeschreven wordt bij de Basisregistratie personen (BRP).
Geslacht (medische observatie)	peri23-40041	Kies uit de waardelijst het geslacht van het kind dat het meest met uw waarnemingen overeenkomt
Geboortedatum	peri23-40050	Vul hier de geboortedatum en liefst ook de geboortetijd van de baby in
Rangnummer kind	peri23-40025	Vul hier (bij een meerling) het volgnummer van het kind in waarbij de eerstgeborene nummer 1 krijgt, de tweede nummer 2 enz.
Perinatale sterfte	peri23-40279	
Perinatale sterfte?	peri23-40280	Vul hier Ja in indien de foetus of het kind is overleden tussen 22 weken en 0 dagen in de zwangerschap en voor 7 dagen na de bevalling. Kies anders voor Nee
Fase Perinatale sterfte	peri23-40290	Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de foetus of baby is overleden.
Datum en tijd vaststelling perinatale sterfte	peri23-40300	Vul hier de datum en liefst ook de tijd in waarop het kind is overleden.

Tijdstip breken vliezen	peri23-80619	Vul hier een datum en liefst ook een tijd in waarop de vliezen zijn gebroken als er tenminste geen sprake is van een hoge vliesscheur.
Episiotomie?	peri23-30050	Vul hier Ja in indien er sprake is van een episiotomie. Kies anders Nee.
Locatie episiotomie	peri23-30055	Kies uit de waardelijst de juiste locatie van de episiotomie.
Pijnbestrijding?	peri23-82090	Vul hier Ja in als er sprake is van pijnbestrijding. Kies anders Nee.
Pijnbestrijding	peri23-82091	
Methode	peri23-82093	
Methode	peri23-82092	Kies uit de waardelijst de juiste methode van pijnbestrijding die is gebruikt.
Kindspecifieke uitkomstgegevens	peri23-dataelement-72	
Type partus	peri23-80626	Kies uit de waardelijst het juiste type bevalling. Let op: Een primaire sectio is een geplande sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen. TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking na 16 weken.
Ligging bij geboorte	peri23-40140	Kies uit de waardelijst de juiste ligging van het kind bij de geboorte
Aanpakker kind	peri23-40149	
Rol aanpakker kind	peri23-40150	Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener die het kind heeft aangepakt.
Supervisor	peri23-40169	
Rol Supervisor	peri23-40170	Kies uit de waardelijst het juiste type supervisor bij de partus. Een supervisor ziet toe de baring een eindverantwoordelijke hoeft er niet bij te zijn.
Lichamelijk onderzoek kind	peri23-80766	

Apgarscore na 5 min.	peri23-40071	Vul hier de Apgarscore in die het kind 5 min. na de geboorte heeft gekregen. Let op: Indien er een AS afgegeven is door de kinderarts die score noteren.
Geboortegewicht	peri23-40060	Vul hier, in grammen, het geboortegewicht van het kind in, zo kort mogelijk na de geboorte gemeten.
Congenitale afwijkingen?	peri23-40080	Vul hier Ja in indien het kind aangeboren lichamelijke afwijkingen lijkt te hebben. Kies anders voor Nee.
Congenitale afwijkingen (groep)	peri23-dataelement-40081	
Specificatie Congenitale afwijkingen (groep)	peri23-40082	
Specificatie Congenitale afwijkingen	peri23-40090	Kies uit de waardelijst de juiste aangeboren afwijking.
Chromosomale afwijkingen	peri23-40110	Vul hier ja in als de aangeboren afwijkingen passen bij een chromosomaal probleem. Kies anders voor Nee
Specificatie chromosomale afwijking	peri23-40111	
Specificatie chromosomale afwijking	peri23-40120	Kies uit de waardelijst de juiste chromosomale afwijking.
Kinderarts Betrokken?	peri23-82119	Vul hier Ja in als de kinderarts binnen 24 uur na de bevalling betrokken is geweest bij de baby. Kies anders voor Nee.
Betrokkenheid kinderarts	peri23-82120	
Datum betrokkenheid	peri23-82122	Vul hier de datum en zo mogelijk ook de tijd in waarop de kinderarts of neonatoloog bij de baby betrokken is geweest.
Type betrokkenheid	peri23-82121	Kies uit de waardelijst het juiste type betrokkenheid van de kinderarts, dus of het gaat om een consult of een overdracht naar de kinderarts